



セルフメディケーション

税 控除 対象


第2類医薬品

お子さまのせき・たんのからみに



©タツノプロ

3ヶ月以上8才未満 120mL



特徴

「アズビちゃんのこどもせきどめシロップG」は3カ月から8才未満のお子さま用のせき止めシロップです。せきを鎮め、たんの切れをよくします。



新しい味を順次発売
何の味が出るか
お楽しみに!



中北薬品株式会社
愛知県津島市白浜町字番場52-1

【お問い合わせ先】

0567-32-1431

受付時間：9時から17時まで

(土、日、祝日及び弊社指定休日を除く)

【特徴】

「アキビちゃんのこどもせきどめシロップG」は3カ月から8才未満のお子さま用のせき止めシロップです。せきを鎮め、たんを切れをよくします。計量カップと誤飲対策の安全キャップ付きです。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがある。)

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
- (5) 次の診断を受けた人。緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アライキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

5才以上8才未満・・・1回 10mL

3才以上5才未満・・・1回 7.5mL

1才以上3才未満・・・1回 6mL

3カ月以上1才未満・・・1回 3mL

3カ月未満・・・服用しないでください

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。また、約4時間の間隔をおいていただければ1日6回まで服用できます。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3) 用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】1日量(60mL中)

有効成分	含量	はたらき
デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物	20 mg	せき中枢に働き、せきをしずめます。
グアイフェネシン	100 mg	気道粘膜に働いて、たんを出やすくします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	4 mg	炎症に伴うせきをしずめます。

添加物として、白糖、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸、安息香酸ナトリウム、パラベン、プロピレングリコール、香料を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問い合わせ先】

- (1) 購入した薬局・薬店
- (2) 中北薬品株式会社 製薬工場事業部
電話 : 0567-32-1431
受付時間 : 9時から17時まで
(土、日、祝日及び弊社指定休日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

【内容量】120mL



製造販売元

中北薬品株式会社

愛知県津島市白浜町字番場 52-1